

Belle de Cacak

Origine: Wagenheimer x Pozegaca. FRI, Cacak, Serbie.



Fruit

37 - 40 mm, 37 – 46 g. Bleu foncé, pruine, très bel aspect. Si l'arbre n'est pas surchargé et qu'on ne récolte pas trop tôt, la qualité de la chair et du jus ainsi que la saveur sont bonnes. Teneur en sucre basse : 14 – 17° Brix. Noyau libre.



Potentiel de production

Mise à fruit précoce, rendements très bons et réguliers.

Arbre

Vigueur à peine moyenne, port érigé, bonne ramification, bien garni, bel arbre. La taille devrait volontairement se concentrer sur le bois d'un an. La qualité des fruits est plus mauvaise sur le vieux bois.

Sensibilité:

Sensibilité moyenne à la moniliose. Parfois, les fruits éclatent autour du pédoncule. Variété tolérante à la sharka.

Culture


Floraison et pollinisation:

Floraison mi-précoce; autofertile. Pollinisateurs possibles Cacaks Schöne, Ersinger, Fruchtbare, Hanita et Katinka.

Fertilité et éclaircissage:

Eclaircissage nécessaire pour obtenir une bonne qualité.

Un test étendu auprès des consommateurs a montré que Belle de Cacak devrait atteindre les normes de qualité suivantes: >13.8 Brix, < 10 g/L d'acidité (Höhn et al., 2004). En 2006, suffisamment de sucre étant présent à maturité, mais en raison des conditions météorologiques, l'acidité ne s'est dégradée que très lentement.



Récolte

Maturité début à mi-août.

Quand les fruits ont viré au bleu, on doit encore les laisser au moins 15 jours environ sur l'arbre pour obtenir une qualité suffisante.

Résumé

Variété productive avec une maturité intéressante qui peut présenter une valeur pour la production de fruits de table à condition de bien éclaircir et récolter au bon moment.