

# Fertile de Cacak

**Origine:** Stanley x Pozegaca. FRI, Cacak, Serbie



## Fruit

33 - 35 mm, 32 - 38 g. Bleu foncé, certaines année violet, pruine. La chair est juteuse, jaune à jaune verdâtre, bien sucrée (19 – 23° Brix) et d'une excellente saveur. Noyau libre.



## Potentiel de production

Mise à fruit précoce et très bons rendements. Tendance à la surcharge. Si trop chargée, la coloration et le calibrage en pâtissent.

## Arbre

Vigueur relativement faible, port érigé à tombant, arbres suffisamment ramifiés et garnis. Tendance au dégarnissage. Tendance à se dégarnir, forte taille du bois fruitier nécessaire.

### Sensibilité:

Sensible à la sharka.

## Culture

### Floraison et pollinisation:


Floraison mi-précoce. Autofertile. Pollinisateurs possibles Cacaks Schöne, Ersinger, Hanita et Katin-ka.

### Fertilité et éclaircissage:

Fort éclaircissage nécessaire pour garantir une bonne qualité de fruits,

## Résumé

**Pruneau de table avec des fruits de très bonne qualité, mais une forte tendance à la surcharge ; éclaircissage indispensable pour obtenir une bonne qualité. Peut se substituer à Fellenberg dans les régions sèches.**



## Récolte

Fin août à mi-septembre.

Une récolte trop précoce engendre une relation sucre/acidité trop basse. L'acidité diminue fortement juste avant la récolte. A maturité, la teneur en sucre est nettement plus élevée que pour Belle de Cacak.