

Einsatzperioden von PSM 2017

23.3.2017



BBCH 56
Baggiolini D



59
E2



61
F



65
F2




65
F2



67
G



69
H



74
J

Myco-Sin

Ab Ballonstadium bis abgehende Blüte in 5-tägigen Intervallen

Serenade Max

1. Behandlung bei 10% offener Blüte, weitere Behandlungen alle fünf Tage, bis alle Blüten offen sind

Blossom Protect

Behandlung ein Tag vor hoher Infektionsgefahr. Bei mehreren aufeinanderfolgenden Tagen mit hoher Infektionsgefahr muss die Behandlung alle zwei Tage wiederholt werden

LMA (Bio: nur mit Versuchsbewilligung FiBL)

Einsatz gem. Allgemeinverfügung BLW

Regalis

(nicht für Bio)

1. Behandlung bei 3 bis 5 voll entwickelten Blättern bzw. bei einer Länge von 3 bis 5 cm (Ende der Blüte).
2. Behandlung ca. 3 bis 5 Wochen nach der ersten Behandlung

Vacciplant

1. Behandlung bei grüner Knospe, Behandlungen bis Ende der Blüte alle 10 Tage wiederholen

Bion (nicht für Bio)

vor der Blüte 20 g/ha, während der Blüte 40 g/ha, nach der Blüte 20 g/ha

Serenade WPO

Bewilligung beendet.

Ausverkaufsfrist: 31.12.2016,

Aufbrauchfrist: 31.12.2017

Serande Max

Stähler hat Vertrieb eingestellt.

Bewilligung weiterhin aktiv (28.2.19)

Regalis Plus

Kernobst: Teilwirkung Feuerbrand.

Produkt noch nicht im Handel

verfügbar



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope