

Evaluation de la douleur selon l'échelle EQUUS-FAP (*Equine Utrecht University Scale for Facial Assessment of Pain*)

Données	Catégories	Note	Facteurs de pondération
Tête	- Mouvements normaux de la tête/ Intérêt pour l'environnement - Moins de mouvements - Pas de mouvement	0 1 2	3
Paupières	- Ouvertes, la sclère est visible en cas de mouvement des yeux/de la tête - Yeux plus ouverts ou paupières plus serrées. Le bord de la sclère est visible 50 % du temps - Yeux nettement plus ouverts ou resserrement évident des paupières. La sclère est visible plus de 50 % du temps	0 1 2	2
Attention	- Axé sur l'environnement - Moins axé sur l'environnement - Non axé sur l'environnement	0 1 2	2
Naseaux	- Détendus, - Un peu plus ouverts - Manifestement plus ouvertes, naseaux dilatées et respiration éventuellement audible	0 1 2	1
Commissure des lèvres	- Détendu - Légèrement relevé - Manifestement relevé	0 1 2	2
Tonus musculaire sur le visage	- Pas de fasciculations - Fasciculations légères - Fasciculations évidentes	0 1 2	1
Flehmen et/ou bâillement	- Pas vu - Vu	0 2	0
Grincement des dents et/ou gémissements	- Non entendu - Entendu	0 2	1
Oreilles	- Position : orientation vers le son/réponse claire avec les deux oreilles ou l'oreille la plus proche de la source - Réponse retardée/réduite aux sons - Position : vers l'arrière / aucune réponse aux sons	0 1 2	2
Total		.../18	

La valeur seuil permettant de différencier les chevaux en bonne santé des chevaux souffrant de coliques était de 5 pour l'EQUUS-COMPASS, et de 11 pour différencier les patients traités de manière conservatrice de ceux traités chirurgicalement ou euthanasiés. Pour l'EQUUS-FAP, les valeurs seuils étaient respectivement de 4 et 6.