

Categoria 4: Additivi zootecnici*Gruppo funzionale: d) Altri additivi zootecnici*

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (promotori della crescita)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d1712 Danstar Ferment AG	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I- 4622	Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	Tutte le specie di pesci Tutti i crostacei	-	1 x 10 ⁹ CFU/kg	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo è utilizzato soltanto negli alimenti per animali solidi. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.	25 febbraio 2030

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d7 Latochema Co Ltd rappresentata da saqual GmbH	Cloruro di ammonio	Composizione dell'additivo: Preparato di cloruro di ammonio ≥ 99,5 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cloruro di ammonio ≥ 99,5 % Formula chimica: NH ₄ Cl N. CAS: 12125-02-9 Cloruro di sodio ≤ 0,5 % Prodotto mediante sintesi chimica	Agnelli da ingrasso	–	–	10 000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo deve essere incorporato negli alimenti sotto forma di premiscela. Per gli agnelli da ingrasso, l'additivo deve essere utilizzato per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi. Per i ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso, l'additivo deve essere utilizzato alle seguenti condizioni: – tenore massimo di 5000 mg di additivo/kg di alimento completo per un periodo di alimentazione superiore a tre mesi o – tenore massimo di 10 000 mg di additivo/kg di alimento completo per un periodo di alimentazione non superiore a tre mesi.	28 settembre 2033
			Ruminanti diversi dagli agnelli da ingrasso	–	–	5000/10 000		
			Scrofe	–	–	5000		
			Cani Gatti	–	–	5000		

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							Per le scrofe l'additivo deve essere utilizzato solo dalla nona all'undicesima settimana di gestazione e dalla quindicesima settimana di gestazione fino alla prima settimana di lattazione. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale degli occhi e delle vie respiratorie. La miscela di diverse fonti di cloruro di ammonio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi destinati a ruminanti, compresi gli agnelli da ingrasso, a cani e gatti e a scrofe.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d210 DSM Nutritional Products Ltd.	Acido benzoico	Acido benzoico (≥ 99,9 %) <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg difenile: ≤ 100 mg/kg	Scrofe	-	5000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono indicare quanto segue negli alimenti complementari per animali: «I alimenti complementari per animali contenenti acido benzoico non devono essere utilizzati per l'alimentazione delle scrofe allo stato naturale. I alimenti complementari per animali destinati alle scrofe sono accuratamente mescolati con altre materie prime per alimenti per animali della razione giornaliera.» È necessario stabilire procedure operative e misure organizzative appropriate volte a tener conto dei rischi di contatto da inalazione, per via cutanea o oculare per chi maneggia l'additivo e le premiscele in un'impresa del settore dell'alimentazione animale. Se uno dei contatti sopra elencati non può essere ridotto ad un livello accettabile dai presenti	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							provvedimenti e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con appositi dispositivi di protezione individuale.	
			Suini da ingrasso	-	5000	10 000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo non può essere usato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati. Le istruzioni per l'uso contengono le seguenti indicazioni: «I alimenti complementari per animali contenenti acido benzoico non possono essere somministrati come tali a suinetti svezzati o a suini da ingrasso, ma devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per alimenti per animali della razione giornaliera». Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi e della pelle.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento delle condizioni intestinali)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4b1705ii	<i>Enterococcus lactis</i> NCIMB 10415	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Enterococcus lactis</i>	Cani	-	2.5 x 10 ⁹ CFU/kg	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele	30 settembre 2034

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento delle condizioni intestinali)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
Cerbios Pharma SA		NCIMB 10415 contenente almeno: - forma microincapsulata con gommalacca: 5 × 10 ⁹ CFU/g di additivo. Forma solida. <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Cellule vitali di <i>Enterococcus lactis</i> NCIMB 10415					indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento del rapporto alimento/peso)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d16 Novonesis Animal Biosolutions AG	Muramidasi (EC 3.2.1.17)	Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338) con un'attività minima di 60 000 LSU (F)/g ¹ In forma solida e liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Muramidasi(EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (DSM 32338)	Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso	-	25 000 LSU(F)	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della cute e dell'apparato respiratorio.	9 giugno 2029

¹ Un'unità LSU(F) è definita come la quantità di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 µg/ml di peptidoglicano marcato con fluorescina al minuto a pH 6,0 e a 30°C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluorescina isomero I.

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento della produzione di uova)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d16 Novonesis Animal Biosolutions AG	Muramidasi (EC 3.2.1.17)	Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 con un'attività minima di 60 000 LSU (F)/g ² In forma solida e liquida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Muramidasi(EC 3.2.1.17), (nota anche come «lisozima»), prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338	Galline ovaiole	-	30 000 LSU(F)	30 000 LSU(F)	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie, nonché dispositivi di protezione degli occhi nel caso in cui l'additivo sia in forma solida.	19 febbraio 2035

² 1 LSU(F) è il quantitativo di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 µg/ml di peptidoglicano marcato con fluoresceina al minuto a pH 6,0 e 30 °C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluoresceina isomero.

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d11 ADM International Sàrl	Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum	<i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum avente un tenore di: – carvacrolo ³ 4,5 %-5,5 % – cinnamaldeide ³ 2,7 %-3,3 % – oleoresine di capsicum ⁴ ≥ 2 % (con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari allo 0,11 %-0,15 %) <i>Caratterizzazione delle sostanze attive</i> – carvacrolo (purezza ≥ 98 %), C ₁₀ H ₁₄ O, N. CAS: 499-75-2 – cinnamaldeide (purezza ≥ 98 %), C ₉ H ₈ O, N. CAS: 104-55-2 – oleoresine di capsicum con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari al 6-7 %)	Polli da ingrasso	-	100	100	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina. Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie	16 agosto 2036

³ JECFA, edizione online: «Specifications for Flavours», <https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/>.

⁴ Oleoresine ottenute mediante estrazione con solventi dei baccelli essiccati di peperoncini rossi indiani (*Capsicum annuum* o *C. frutescens*).

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							respiratorie, degli occhi e della pelle.	
4d20 DSM Nutritional Products Ltd.	Preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo	Preparato di: - carvacrolo (120-160 mg/g) - timolo (1-3 mg/g) - D-carvone (3-6 mg/g) - salicilato di metile (10-35 mg/g) - L-mentolo (30-55 mg/g) - silice amorfa (massimo 100 mg/g) - olio vegetale idrogenato (massimo 700 mg/g) Forma solida incapsulata <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Carvacrolo (numero CAS: 499-75-2) Timolo (numero CAS: 89-83-8) D-carvone (numero CAS: 2244-16-8) salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8) L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8)	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori allevate per la produzione di uova	-	65	105	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.	30 luglio 2030

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d21 Zehentmayer AG	Citrato di lantanoidi	Preparato di citrato di lantanoidi contenente: Citrato di lantanoidi ≥ 65 % Sodio 8-12 % Cloruro 8-12 % Acqua < 10 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Citrato di lantanoidi Lantanio 8,5 ± 0,9 % Formula chimica: C ₆ H ₅ LaO ₇ Numero CAS: 3002-52-6 Cerio 16,3 ± 1,6 % Formula chimica: C ₆ H ₅ CeO ₇ Numero CAS: 512-24-3 Citrato 40 ± 5 % Formula chimica: C ₆ H ₅ O ₇ Numero CAS: 126-44-3	Suinetti svezzati	-	250	250	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	22 ottobre 2030
4d372 Alzchem Trostberg	Acido guanidinoacetico	<i>Composizione dell'additivo:</i> Acido guanidinoacetico 98 % sulla sostanza secca Forma solida	Pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati	-	600	1200	Il tasso di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.	18. dicembre 2033
					300 mg/l di acqua di	600 mg/l di acqua di		

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
GmbH rappresentata da Naveta AG		<i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C ₃ H ₇ N ₃ O ₂ Numero CAS: 352-97-6 Purezza: 98 % Impurità: – tenore massimo di cianammide 0,03 %; – tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.	per la riproduzione		abbeveraggio	abbeveraggio	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.	
			Polli da ingrasso	-	600	1200		25. ottobre 2026
					Suinetti svezati Suini da ingrasso	-	300 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio
			Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	-			600	1200
							200 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio
							300 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio
							600	1200
							300 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							1200 mg/kg di alimento completo.	
4d372i Alzchem Trostberg GmbH rappresentata da Naveta AG	Acido guanidinoacetico	<i>Composizione dell'additivo:</i> Preparato con un tenore minimo di acido guanidinoacetico del 96 % Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica Formula chimica: C ₃ H ₇ N ₃ O ₂ Numero CAS: 352-97-6 Purezza: 98 % Impurità: – tenore massimo di cianammide 0,03 %; – tenore massimo di diciandiammide 0,5 %.	Pollastre allevate per la produzione di uova e polli allevati per la riproduzione	-	600	1200	Il tasso di umidità è indicato sull'etichetta dell'additivo. Per le pollastre, i polli, i suinetti svezzati e i suini da ingrasso l'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio.	18. dicembre 2033
					300 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio		
			Polli da ingrasso	-	600	1200	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.	25. ottobre 2026
					300 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio	Nell'uso dell'additivo occorre prestare attenzione all'integrazione di vitamina B12 e agenti metilanti diversi dalla metionina nell'alimentazione degli animali.	18. dicembre 2033
			Suinetti svezzati	-	600	1200		25. ottobre 2026
			Suini da ingrasso		200 mg/l di acqua di abbeveraggio	600 mg/l di acqua di abbeveraggio	Non è consentito l'uso simultaneo dell'additivo nell'acqua di abbeveraggio e in alimenti per animali.	1° gennaio 2036

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
			Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione	-	600	1200	Tenuto conto dell'effettiva assunzione, da parte degli animali, di acqua di abbeveraggio rispetto agli alimenti, occorre garantire che la quantità di acido guanidinoacetico somministrata nell'acqua di abbeveraggio non sia superiore a quella che si somministrerebbe negli alimenti al tenore massimo di 1200 mg/kg di alimento completo.	1° gennaio 2036

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d19	Olio di origano, olio di carvi, carvacrolo,	Preparato di: – oli essenziali di origano (<i>Origanum vulgare</i> L.) (60-80	Suinetti svezzati	-	75	125	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di	26 febbraio 2030

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
DSM Nutritional Products Ltd.	salicilato di metile e L-mentolo	mg/g) e di semi di carvi (<i>Carum carvi</i> L.) (5-10 mg/g) — carvacrolo (60-80 mg/g), salicilato di metile (10-40 mg/g) e L-mentolo (30-55 mg/g) Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Olio di origano (<i>Origanum vulgare</i> L.) (numero CAS: 8007-11-2) con un tenore di linalolo compreso tra 1,8 e 16 mg/g Olio di semi di carvi (<i>Carum carvi</i> L.) (numero CAS: 8000-42-8) con un tenore di D-carvone compreso tra 2,5 e 6,5 mg/g Olio di carvacrolo (numero CAS: 499-75-2) ≥ 99 % con un contenuto di carvacrolo compreso tra 95 e 140 mg/g (di origano e carvacrolo puro) Salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8) L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8).					conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d10 DSM Nutritional Products Ltd.	Preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo, piperina	Preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo, piperina avente un tenore di: - acido benzoico 80 %-83 % - timolo 1 %-1,9 % - eugenolo 0,5 %-1 % - piperina 0,05 %-0,1 % - salicilato di benzile, salicilato di isoamile e trans-anetolo ≤ 0,6 % <i>Caratterizzazione delle sostanze attive:</i> acido benzoico (≥ 95,5 % in purezza): C ₇ H ₆ O ₂ N. CAS: 65-85-0 Timolo ³ : C ₁₀ H ₁₄ O N. CAS 89-83-8 eugenolo: C ₁₀ H ₁₂ O ₂ N. CAS 97-53-0 piperina: C ₁₇ H ₁₉ O ₃ N N. CAS 94-62-2 salicilato di isoamile N. CAS 87-20-7 salicilato di benzile N. CAS 118-58-1 trans-anetolo N. CAS 4180-23-8	Polli da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole	-	-	300	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. L'additivo non va impiegato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati: Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. Dose minima raccomandata: 300 mg/kg di alimento completo per animali	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d210 DSM Nutritional Products Ltd.	Acido benzoico	Acido benzoico (≥ 99,9 %) <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 65-85-0 Livello massimo di impurità: acido ftalico: ≤ 100 mg/kg difenile: ≤ 100 mg/kg	Suinetti (svez-zati)	-	-	5000	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo non deve essere usato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati. Dose minima raccomandata per suinetti (svez-zati): 5000 mg/kg di alimento completo per animali. Indicare le istruzioni d'uso seguenti: «Non somministrare a suini da ingrasso alimenti complementari per animali contenenti acido benzoico se non dopo averli accuratamente mescolati con altre materie prime per alimenti per animali della razione giornaliera.» Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, Le imprese del settore dell'alimentazione animale	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione
			Suini da ingrasso	-	3000	10 000	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione dell'escrezione urinaria di fosforo)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d1 Provot AG	Carbonato di lantanio ottaidrato	Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l'85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva. <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Carbonato di lantanio ottaidrato $\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 6487-39-4	Gatti	-	1500	7500	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i potenziali rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio. Le istruzioni per l'uso dell'additivo recano la seguente indicazione: «Evitare l'uso contemporaneo di alimenti per animali ad alto contenuto di fosforo».	25 giugno 2029

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione dell'escrezione urinaria di fosforo)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d23 Porus GmbH rappresentata da saqual GmbH	Carbonato di lantanio ottaidrato	Carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l'85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva. Forma solida <i>Caratterizzazione del principio attivo:</i> Carbonato di lantanio ottaidrato $\text{La}_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ Numero CAS: 6487-39-4	Gatti	-	1500	7500	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere somministrato solo ai gatti e cani adulti. Le istruzioni per l'uso dell'additivo devono recare la seguente indicazione: «Per gatti adulti e cani adulti. Evitare l'uso contemporaneo di alimenti per animali ad alto contenuto di fosforo.». Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione	26 settembre 2032
			Cani	-	1500	7500		10 marzo 2035

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione dell'escrezione urinaria di fosforo)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							individuale delle vie respiratorie.	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione della contaminazione delle carcasce con Salmonella spp. mediante la diminuzione della sua presenza nelle feci)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
4d1703 Danstar Ferment AG	Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 contenente almeno: - 2 x 10 ¹⁰ CFU di additivo (forma non rivestita) - 1 x 10 ¹⁰ CFU di additivo (forma rivestita) Caratterizzazione del principio attivo: Cellule vitali di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079	Polli da ingrasso Specie avicole minori da ingrasso	-	1 x 10 ⁹ CFU/kg	-	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Le imprese del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione
			Tacchini da ingrasso	-	1 x 10 ⁹ CFU/kg	-	Domanda di proroga pendente. Autorizzazione estesa fino alla decisione	

Categoria: Additivi zootecnici. Gruppo funzionale: Altri additivi zootecnici (riduzione della contaminazione delle carcasse con Salmonella spp. mediante la diminuzione della sua presenza nelle feci)								
Numero di identificazione dell'additivo Titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg o unità di sostanza attiva/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %			
							ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	